



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ไอกรน

ในเด็ก

อาการคล้ายไข้หวัด
แต่อันตรายถึงตาย

- ไอ ต่อเนื่องตั้งแต่ 1 สัปดาห์
- มีน้ำมูก
- มีเสียงของลมหายใจดัง “วู้ป”
- อาเจียน ในขณะที่ไอหรือหลังอาการไอ
- มีอาการหน้าเขียวหรือหน้าแดงหลังอาการไอ



ป้องกันได้ด้วยการพาเด็กไปฉีดวัคซีนไอกรนตามแพทย์นัดหมายให้ครบถ้วน

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกรน ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี จำนวน 5 ครั้ง

- ครั้งที่ 1 เริ่มเมื่ออายุ 2 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4 เดือน
- ครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน
- ครั้งที่ 4 เมื่ออายุ 18 เดือน
- ครั้งที่ 5 ฉีดวัคซีนกระตุ้นเมื่ออายุ 4 ปี

วันที่ 4 มกราคม 2567



DDC
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



website



facebook

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
12c12.dpc.moph.go.th
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสงขลา

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422



กรมควบคุมโรค
DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL



ไอกรน โรคร้ายอันตรายถึงชีวิต

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (*B. Pertussis*) ทำให้มีการอักเสบของเยื่อเมือกทางเดินหายใจ ติดต่อกันได้ง่ายจากการไอ จาม และสัมผัสสารคัดหลั่ง ระยะฟักตัว เฉลี่ย 7-10 วัน

อาการสำคัญ

ไข้ต่ำ ๆ มีน้ำมูก ไอ ต่อเนื่องประมาณ 1 สัปดาห์ ไอชอน ๆ ที่ ๆ ติดกัน 5-10 ครั้ง/มากกว่านั้น จนทำให้หายใจไม่ทัน หายใจมีเสียงดังวู๊ป อาการอาจเป็นเรื้อรัง ติดต่อกันนานถึง 2-3 เดือน หากมีอาการดังกล่าว รีบไปพบแพทย์ **ไม่ซื้อยามาทานเอง**



ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไอกรนในเด็ก

อายุน้อยกว่า 6 ปี จำนวน 4-5 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เริ่มเมื่ออายุ 2 เดือน
ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4 เดือน
ครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน
ครั้งที่ 4 เมื่ออายุ 18 เดือน
ครั้งที่ 5 ฉีดวัคซีนกระตุ้นเมื่ออายุ 4 ปี



ข้อมูล ณ วันที่ 1/10/2562

